

INTERSTICIJALNA TRUDNOĆA NAKON ISTOSTRANE SALPINGEKTOMIJE - PRIKAZ BOLESNIKA

Žaklina Savić Mitić¹, Mirko Trailović¹, Dragiša Mitić²

Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko akušerska služba, Srbija¹
Zavod za javno zdravlje "Timok", Zaječar, Srbija²

Kontakt: Žaklina Savić Mitić
Adresa: Požarevačka 63/7, 19000 Zaječar
E-mail: zaklina1009@gmail.com

Intersticijalna trudnoća predstavlja ektopičnu trudnoću koja se javlja u intramuralnom (intersticijalnom) delu tube uterine. Učestalost ektopičnih trudnoća je 3-4%. Značajna je zbog dugog asimptomatskog perioda i čestog završetka rupturom roga uterusa, kao teškom komplikacijom. Smrtnost nakon ovog vida ektopične trudnoće je oko 2,5%. U radu je prikazana bolesnica stara 29 godina, primljena zbog sumnje na ektopičnu intersticijalnu trudnoću u levom rogu uterusa. U anamnezi je imala levostranu tubarnu trudnoću završenu salpingektomijom nakon rupture tube uterine. Bolesnica je pregledana klinički i ultrazvukom, praćen je nivo β -HCG, te je nakon adekvatne preoperativne pripreme, operisana. Hirurška intervencija se sastojala u inciziji gravidno izmenjenog roga uterusa, kiretaži i evakuaciji ovularnog tkiva, čime je sačuvan rog uterusa. Pravovremenom dijagnozom intersticijalne trudnoće mogu se preduprediti njene moguće teške komplikacije. *Acta Medica Medianae 2015;54(2):52-55.*

Ključne reči: *intersticijalna trudnoća, ektopična trudnoća, salpingektomija*