

BORBA SA VREMENOM U LEČENJU ILSOVE BOLESTI

*Branislav Tomašević¹, Sonja Cekić¹, Marija Trenkić-Božinović¹,
Aleksandar Veselinović¹, Gordana Stanković-Babić^{1,2}*

Klinika za očne bolesti, Klinički centar Niš, Niš, Srbija¹
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija²

Kontakt : Branislav Tomašević
Obrenovićeve 124/2-5, 18000 Niš, Srbija
E-mail: banetom62@gmail.com

Ilovu (Eales) bolest karakterišu tri stadijuma koji se prožimaju: retinalni vaskulitis, okluzija i neovaskularizacija. Dijagnoza se uglavnom postavlja na osnovu kliničkog pregleda, a čini se da je etiologija multifaktorijalna. Prikazan je slučaj dvadesetšestogodišnje žene sa manifestnim vaskulitisom periferije retine, okluzijom, retinalnom neovaskularizacijom i krvarenjem u staklastom telu. U zavisnosti od stadijuma bolesti, lečenje se sastojalo od tretmana kortikosteroidima u stadijumu aktivne upale i laser koagulacije u uznapreovalom stadijumu retinalne ishemije i neovaskularizacije. Urađene su brojne delikatne operacije oka zbog ponovljenih krvarenja i ablacije retine. Stečeno iskustvo u toku lečenja je dokaz o neophodnosti za tretman odmah po dijagnostikovanju Ilove bolesti. Odluka o preduzimanju intenzivnog tretmana laserom i vitroretinalne operacije u pravo vreme može da unapredi rezultate u lečenju Ilove bolesti. *Acta Medica Medianae 2015;54(4):59-63.*

Ključne reči: *Ilova bolest, ablacija retine, vitrektomija*