

TRETMAN KLINIČKI IZLEČENIH BOLESNIKA OD TONZILOFARINGITISA SA STREPTOKOKOM GRUPE A IZOLOVANIM IZ BRISA GRILA

Radica Živković-Zarić¹, Milan Zarić², Slobodan Janković³

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija¹

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za biohemiju, Kragujevac, Srbija²

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Kragujevac, Srbija³

Kontakt: Radica Živković-Zarić

K. A. I Karadjordjevića 182/13

Kragujevac, Srbija

radica_zivkovic@yahoo.com

Tonzilofaringitis izazvan streptokokom grupe A (the group A streptococcus, GAS) je veoma česta bolest kod dece. Neopravdana upotreba antibiotika je česta, kako za lečenje samih simptoma tako i za lečenje zdravih kliconoša. Cilj naše studije bio je da otkrijemo razloge neopravdane upotrebe antibiotika kod tonzilofaringitisa izazvanim streptokokom grupe A. Studiju smo sprovedi kroz intervju sa specijalistima pedijatrije i roditeljima dece lečene od tonzilofaringitisa, opservacijom nekoliko slučajeva u samim ordinacijama kao i pregledom medicinske dokumentacije. Otkrili smo da lekari imaju različit pristup u lečenju samog tonzilofaringitisa, kao i u lečenju kliconoštva. Lekari su pod pritiskom od strane roditelja da propišu antibiotike, a i roditelji su skloni da daju deci antibiotike bez konsultacije lekara. Takvo ponašanje se može delimično objasniti nedostatkom sredstava za laboratorijske analize. Takođe, bolesnici mogu još uvek da kupe antibiotik bez lekarskog recepta. Potrebno je kulturu propisivanja i uzimanja antibiotika kod lekara i bolesnika podići na viši nivo. *Acta Medica Medianae* 2015;54(4):46-51

Ključne reči: tonzilofaringitis, kliconoštvo, antibiotici, deca