

Intracistični papilarni karcinom u dojci muškarca: trideset godina nakon orhiektomije

Vuka Katić¹, Danijela Radojković², Zoran Radovanović³, Ivan Nagorni⁴,
Andrija Jović⁴, Maja Nedić⁵

¹Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

²Klinika za endokrinologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

³Centar za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

⁴Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

⁵Medicinski centar, Ražanj, Srbija

SAŽETAK

Papilarni karcinom je izuzetno redak karcinom dojke kod muškaraca. Prikazuje se bolesnik star 83 godine sa retroareolarnom palpabilnom masom udruženom sa krvavom sekrecijom iz dojke.

Na citološkom preparatu nađeno je prisustvo retkih klastera tumorskih ćelija i papilarnih formacija sa uvećanim hiperhromatskim jedrom okruženim eritrocitima. Imajući u vidu da pouzdana dijagnoza papilarnog karcinoma nije moguća na osnovu citološkog nalaza i da papilarne formacije nađene u citološkom materijalu zahtevaju biopsiju promene, izvršena je poštedna hirurška operacija dojke.

Na patohistološkom materijalu nađen je cistično prošireni duktus obložen atipičnim papilarnim formacijama, koje premošćuju njegov lumen, odsustvo mioepitelnih ćelija i stromalne invazije.

Serumske vrednosti prolaktina i testosterona bile su snižene. Imunohistohemijsko bojenje na aktin, estrogenske i progesteronske receptore bilo je negativno.

Autori naglašavaju da je bolesnik imao levu orhiektomiju izvršenu zbog tuberkuloznog epididimoorhitisa sa skrotalnom fistulom pre 30 godina. Dvanaest meseci nakon poštedne operacije dojke, bolesnik je zdrav.

Ključne reči: papilarni karcinom kod muškarca, citologija, patohistologija, imunohistohemija, tuberkulozni orhiepididimitis