

Razlozi neadekvatne vakcinacije nakon splenektomije

Marko Tanasković¹, Slobodan Janković^{2,3}, Božidar Odalović^{4,5}, Nedim Hamzagić⁶

¹Dom zdravlja Gračanica, Gračanica, Srbija

²Klinički centar Kragujevac, Odeljenje za kliničku farmakologiju, Kragujevac, Srbija

³Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, Kragujevac, Srbija

⁴Klinički centar Priština-Gračanica, Odeljenje za hirurgiju, Gračanica, Srbija

⁵Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Srbija

⁶Dom zdravlja Tutin, Odeljenje za nefrologiju, Tutin, Srbija

SAŽETAK

Cilj ove studije bio je da se analiziraju razlozi zbog kojih se ne prate vodiči za postsplenektomijsku vakcinaciju. Imajući u vidu da vakcinacija smanjuje rizik od ozbiljnih postsplenektomijskih sepsi, važno je da se odrede razlozi za neadekvatne vakcinacije nakon splenektomije.

Naša studija je kvalitativna, bazirana na intervjuima sa šestorom hirurga, jednim lekarom opšte prakse i tri pacijenta koji su bili podvrgnuti splenektomiji, kao i na uvidima u kartone i otpusne liste bolesnika.

Ustanovljeno je da zdravstveni tim i bolesnici imaju nedovoljno znanja o postsplenektomijskoj vakcinaciji. Takođe, ustanovljeno je da splenektomijski registri, medicinske narukvice, kao i karton vakcinacije i dalje nisu deo naše prakse.

Naša studija je pokazala da je obrazovanje bolesnika, kao i medicinskog tima, krucijalno da bi se pratili vodiči za postsplenektomijsku vakcinaciju, što je u skladu sa rezultatima drugih studija.

Kako bi se povećao stepen primene postsplenektomijske vakcinacije, neophodno je poboljšati edukaciju medicinskog tima i bolesnika, kao što je neophodno početi sa korišćenjem splenektomijskih registara, medicinskih narukvica i kartona vakcinacije.

Ključne reči: splenektomija, vakcinacija, kvalitativna, edukacija