

## VIDNA FUNKCIONALNOST I KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA SA PSEUDOFAKIJOM

Dubravka Vukša<sup>1</sup>, Divna Stamenković<sup>1</sup>, Olja Đokić<sup>1</sup>, Maja Živković<sup>2</sup>,  
Jana Mirković<sup>1</sup>, Marko Zlatanović<sup>2</sup>, Vesna Jakšić<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, K.Mitrovica, Srbija

<sup>2</sup>Klinika za očne bolesti, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

<sup>3</sup>Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Srbija

*Kontakt:* Dubravka Vukša  
A. Dinana bb, K.Mitrovica, Srbija  
E-mail: bojana1987@mts.rs

Smanjenje ili gubitak vidne funkcije zbog katarakte je prepreka u obavljanju svakodневних aktivnosti i dovodi do pada kvaliteta života bolesnika. Cilj rada bio je utvrditi uticaj hirurgije katarakte na vidnu funkcionalnost i kvalitet života bolesnika sa pseudofakijom. Anketirano je 202 bolesnika kod kojih su urađene 242 hirurške inter-vencije, odnosno 40 bolesnika je operisalo oba oka. Postoperativni rezultati svih analiziranih upitnika kod svih bolesnika i to: VF-14 ( $87,85 \pm 17,10$  medijana 95,80), CATQ ( $13,72 \pm 6,30$  medijana 12,00) i EQ-5D ( $5,78 \pm 1,47$  medijana 5,00) statistički su značajno bolji od preoperativnih. Bolesnici sa pseudofakijom imaju statistički značajno bolje i preoperativne ( $76,23 \pm 18,09$  medijana 79,75) i postoperativne ( $90,89 \pm 15,66$  medijana 97,90) rezultate, VF-14 upitnika u odnosu na bolesnike koji su na drugom oku imali kataraktu. Vrednosti CATQ upitnika bolesnika sa pseudofakijom su niže i pre ( $21,19 \pm 7,25$  medijana 21,00) i posle ( $12,63 \pm 6,17$  medijana 10,00) operacije katarakte u odnosu na bolesnike u grupi sa kataraktom. Bolesnici sa pseudofakijom imaju niže i preoperativne ( $7,54 \pm 1,64$  medijana 7,00) i postoperativne ( $5,66 \pm 1,35$  medijana 5,00) vrednosti EQ-5D upitnika u odnosu na bolesnike koji su na drugom oku imali kataraktu. Bolesnici sa pseudofakijom imaju značajno bolju vidnu funkcionalnost i kvalitet života i pre i posle operacije u odnosu na bolesnike koji su na drugom oku imali kataraktu.

*Acta Medica Medianae 2018;57(1):19-24.*

**Ključne reči:** senilna kataraka, vidna funkcionalnost, kvalitet života