

EKSTRAMAMARNA PAGETOVA BOLEST INGVINUMA

Vesna Karanikolić^{1,4}, Aleksandar Karanikolić^{2,4}, Dejan Petrović^{3,4}, Danijela Popović¹,
Maša Golubović¹, Miodrag Đorđević²

¹Klinika za dermatologiju, Klinički centar Niš, Srbija

²Klinika za opštu hirurgiju Klinički centar Niš, Srbija

³Institut za kardiovaskularne bolesti i rehabilitaciju Niška Banja, Srbija

⁴Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

Kontakt: Vesna Karanikolić
Vardarska 23, 18000 Niš, Srbija
E-mail: pean@ptt.rs

Ekstramamarna Pagetova bolest (EMPB) predstavlja retki intraepitelni maligni tumor koji je povezan sa invazivnim adenokarcinomima, kao i sa drugim sekundarnim karcinomima. Dijagnoza se potvrđuje prisustvom Pagetovih ćelija na histopatološkom ispitivanju uzorka tkiva. Standardna metoda lečenja za preponsku EMPB, kao i za EMPB u drugim područjima, je hirurška resekcija. Predstavljamo bolesnika s ekstramamarnom Pagetovom bolešću, koji je razvio eritematozne erupcije u desnoj imgvinalnoj regiji.

Acta Medica Mediana 2018;57(2):31-33.

Ključne reči: ekstramamarna Pagetova bolest, ingvinum, dijagnoza, tretman