

KATAMENIJALNA EPILEPSIJA- NOVINE U LEČENJU

Stevo Lukić

Klinika za neurologiju, Klinički centar Niš, Srbija
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

Kontakt: Stevo Lukić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Niš
Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija
E-mail: slukic@medfak.ni.ac.rs

Katamenijalna epilepsija predstavlja tip epilepsije koja se karakteriše pogoršanjem i grupisanjem napada u perimenstrualnom ili periovulatornom periodu. Neuroaktivna svojstva reproduktivnih steroida i ciklična varijacija u njihovim koncentracijama važni su patofiziološki faktori. Najnovija istraživanja su pokazala i potvrdila postojanje najmanje tri obrasca katamenijalnog pogoršanja napada: perimenstrualno i periovulatorno kod ovulatornih ciklusa i obrazac tokom cele lutealne faze kod anovulatornih ciklusa. Racionalni modeli su identifikovali da približno jedna trećina žena sa epilepsijom može imati katamenijalno pogoršanje napada. Otvorene studije koje su koristile ciklično dodavanje prirodnih progesteronskih preparata, depo medrokiprogesteron i analoge gonadotropin-oslobađajućeg hormona pokazale su terapijske benefite kod određenih formi katamenijalne epilepsije. Stoga je važno da lekar ima na umu katamenijalnu epilepsiju kao česti oblik epilepsije kod žena i da prepozna specifične kliničke obrasce koji mogu imati dobar terapijski odgovor.

Acta Medica Medianae 2018;57(4):117-121.

Ključne reči: epilepsija, reproduktivni hormoni, grupisanje napada, menstruacija