

## SUBDURALNI HEMATOM SA SIMPTOMIMA EPILEPTIČNOG NAPADA NAKON SUBARAHNOIDALNE ANESTEZIJE – PRIKAZ SLUČAJA

Emilija Ivanov<sup>1</sup>, Dafina Karadžova<sup>1</sup>, Ana Doneva<sup>2</sup>, Jordan Nojkov<sup>3</sup>, Atanas Sivevski<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Univerzitetska Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerziteta Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, BJR Makedonija

<sup>2</sup>Opšta Bolnica 8 Septembar, Skoplje , BJR Makedonija

<sup>3</sup>Univerzitet Goce Delčev, Štip, BJR Makedonija

Kontakt: Emilija Ivanov  
E-mail: ivanovemilija@gmail.com

U radu se opisuje slučaj subduralnog hematomu koji se razvio posle carskog reza kod 34-godišnje bolesnice nakon normalnog intraoperativnog toka. Tokom prvih dvanaest časova nakon operacije, kod bolesnice se javila glavobolja za koju se smatralo da predstavlja postduralnu punkcionu glavobolju (PDPH), pa je u tom smislu i tretirana. Nakon trećeg postoperativnog dana, dolazi do slabljenja glavobolje tako da je petog dana otpuštena iz bolnice u dobrom opštem stanju. Neposredno nakon otpusta, glavobolja se ponovo javlja, dugotrajnija i jača po intenzitetu, da bi kasnije progredirala u epileptični status. Snimanjem magnetnom rezonancom utvrđeno je postojanje hematomu u apsorpciji. Nakon konzervativne terapije, dolazi do poboljšanja bez pojave neuroloških posledica. U okviru ovog rada razmatrani su razlike između PDPH i glavobolja drugog porekla, kao i etiopatogeneza subduralnog hematomu u opstetriciji. Došlo se do zaključka da u slučaju dugotrajne, perzistirajuće glavobolje treba imati u vidu i subduralni hematom kao komplikaciju, zato što rana dijagnoza i odgovarajuće lečenje vode ka potpunom oporavku.

*Acta Medica Medianae 2018;57(4):144-147.*

**Ključne reči:** subduralni hematom, carski rez, postduralna punkcionalna glavobolja, neuraksijalni blok, subarahnoidalna anestezija