

KLINIČKA PREZENTACIJA REKURENTNE EPIZODE VELIKOG DEPRESIVNOG POREMEĆAJA SA POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM ILI BEZ NJEGA

Maja Simonović^{1,2}, Tatjana Milenković², Ninoslava Simić^{1,2}, Bojan Nedović¹

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

²Klinika za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

Kontakt: Maja Simonović
Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija
E-mail: simonovicmaja@gmail.com,
maja.simonovic@medfak.ni.ac.rs

Cilj rada je upoređivanje težine aktuelne rekurentne epizode u grupi subjekata koji pate od velikog depresivnog poremećaja i komorbidnog posttraumatskog stresnog poremećaja sa grupom subjekata koji pate samo od velikog depresivnog poremećaja. Ukupno 120 subjekata sagledano je i raspoređeno u dve grupe. U grupu D/PTSP raspoređeni su subjekti koji su ispunjavali dijagnostičke kriterijume za rekurentnu epizodu velikog depresivnog poremećaja i posttraumatski stresni poremećaj. U grupu D/only raspoređeni su subjekti koji su ispunjavali dijagnostičke kriterijume za rekurentnu epizodu velikog depresivnog poremećaja. Procena težine rekurentne epizode vršena je korišćenjem instrumenata: Montgomery-Asberg skale za depresiju, Hamiltonove skale za depresiju i inventara depresivne simptomatologije. Podaci su analizirani Studentovim t-testom nezavisnih uzoraka. Rezultati su pokazali da je težina aktuelne rekurentne epizode velikog depresivnog poremećaja bila veća kod subjekata koji su patili od komorbidnog posttraumatskog stresnog poremećaja u odnosu na subjekte koji su patili samo od rekurentne epizode velikog depresivnog poremećaja i potvrđuju da predstavlja značajan klinički entitet.

Acta Medica Medianae 2019;58(3):67-71.

Ključne reči: : stresni poremećaj, posttraumatski poremećaj, veliki depresivni poremećaj