

MOGUĆNOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE PSEUDOANEURIZMI LIJENALNE ARTERIJE - PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE

Miroslav Mišović^{1,2}, Jelena Golubović¹, Igor Sekulić¹, Saša Dragović³, Nemanja Rančić^{1,2}

¹Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

²Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

³Klinika za opštu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

Kontakt: Miroslav Mišović
Crnotravska 17, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: miki_misic@yahoo.com

Pseudoaneurizme lijenalne arterije predstavljaju ekstremno retko, ali potencijalno fatalno medicinsko stanje. U literaturi je do sada opisano ukupno manje od 250 slučajeva. Najčešći uzročnik ovog retkog stanja je pankreatitis. Bolesnici sa pseudoaneurizmama lijenalne arterije skoro uvek imaju ozbiljne kliničke simptome. Ruptura pseudoaneurizme može izazvati komplikacije sa fatalnim posledicama. Rad ima za cilj da prikaže mogućnosti radiološke dijagnostike pseudoaneurizme lijenalne arterije kod bolesnika sa hroničnim pankreatitisom. Bolesniku su inicijalno urađene ultrazvučna i kolor dopler dijagnostika, pomoću kojih je otkrivena promena suspekt na pseudoaneurizmu lijenalne arterije. Nakon ultrazvučnog pregleda sa kolor doplerom, urađene su CT angiografija i digitalna subtrakciona angiografija, kojima je potvrđena inicijalna dijagnoza. Bolesnik je lečen hirurški, a histopatološkim nalazom definitivno je postavljena dijagnoza pseudoaneurizme lijenalne arterije.

Acta Medica Medianae 2019;58(3):177-183.

Ključne reči: pseudoaneurizma lijenalne arterije, radiološka dijagnostika, ultrazvuk, CT, DSA