

HIRURŠKO LEČENJE UZNAPREDOVALOG KARCINOMA KAPKA KOJI INFILTRIRA PREDNJE PERIBULBARNO MASNO TKIVO UZ OČUVANJE OČNE JABUČICE – PRIKAZ SLUČAJA

Nina Vujošević^{1,3}, Predrag Kovačević^{2,4}

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Student doktorskih studija, Niš, Srbija

²Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

³Klinika za oftalmologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

⁴Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

Kontakt: Nina Vujošević

Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija

E-mail: lazic.nina88@gmail.com

Karcinom bazalnih ćelija (KBC) najčešći je malignitet kapka, koji prate karcinom skvamoznih ćelija i drugi retki tumori. KBC periokularne kože često se širi u dublje slojeve i infiltrira orbitu. Periorbitalni maligniteti uglavnom se ponašaju mnogo agresivnije nego maligniteti na ostalim mestima na koži. U slučaju infiltracije orbite, hiruško lečenje ostaje izazov.

Prikazan je šezdesetčetvorogodišnji bolesnik muškog pola sa karcinomom bazalnih ćelija kože periorbite koji invadira u orbitu. Bolesnik je odbio egzenteraciju orbite. Izvedena je ekscizija tumora sa primarnom rekonstrukcijom i očuvanjem očne jabučice. Za vreme dvogodišnjeg praćenja, nije bilo znakova recidiva tumora, ali su pokreti očne jabučice bili blago redukovani.

Iako u većini slučajeva orbitalne invazije egzenteracija ostaje izborna metoda lečenja, poštredna operacija očne jabučice može biti odgovarajuća kod određenih bolesnika. Zlatni standard u lečenju predstavlja ekstenzivna hirurgija, kod koje se očekuje najniža stopa recidiva. Primarna rekonstrukcija omogućava zadovoljavajuće estetske i funkcionalne rezultate.

Acta Medica Medianae 2020;59(1):83-89.

Ključne reči: karcinom bazalnih ćelija, egzenteracija, poštredna ekscizija očne jabučice