

METASTAZA INVAZIVNOG DUKTALNOG KARCINOMA DOJKE U PREDELU TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA DVE GODINE NAKON INICIJALNOG TRETMANA: PRIKAZ SLUČAJA

Predrag Radović^{1,2}, Milovan Papović¹, Miloš Trajković¹, Nikola Živković^{2,3}, Andrija Ćosić^{1,2}

¹Klinika za stomatologiju, Odeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju, Niš, Srbija

²Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, Srbija

³Institut za patologiju, Niš, Srbija

Kontakt: Milovan Papović

Bulevar dr Zoran Djindjić 48, 18000 Niš, Serbia

E-mail: milovanpapovic@gmail.com

Metastaze tumora u predelu usne duplje i vilice predstavljaju redak patološki entitet. Ovakvi tipovi tumora predstavljaju težak izazov za onkološke hirurge zbog otežane dijagnostike, nespecifične simptomatologije i netipičnog radiografskog nalaza. Simptomi koji se javljaju kod metastatskih tumora temporomandibularnog zgloba i ramusa donje vilice najčešće su nespecifični i manifestuju se u vidu bolnih senzacija, otoka, otežanog otvaranja usta, što kliničara često odvodi na oboljenja temporomandibularnog zgloba kao što su artritis, subluksacija zgloba, degenerativne promene i infekcije.

U našem slučaju prikazana je pacijentkinja stara 62 godine sa postojanjem metastatskog tumora u predelu temporomandibularnog zgloba i donje vilice sa veoma neizvesnom prognozom. U daljem tekstu diskutovaće se o izboru hirurške i onkološke terapije na osnovu radiografskih nalaza i histopatološkog tipa karcinoma

Acta Medica Medianae 2020;59(1):90-95.

Ključne reči: *metastaza karcinoma dojke, temporomandibularni zglob, histopatološki tip i podtip, hirurški tretman*