

MULTIPLI MODALITETI LEČENJA ARAHNOIDALNE CISTE I MOGUĆE KOMPLIKACIJE

Predrag Milošević¹, Aleksandar Kostić^{1,2}, Boban Jelenković¹, Luka Berilažić¹, Slavko Živković¹, Bojan Stanojević¹

¹Klinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju, Niš, Srbija

²Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

Kontakt: Predrag Milošević
Jovana Skerlića 10, 18000 Niš, Srbija
E-mail: pedja@doctor.com

Arahnoidalne ciste su benigne, kongenitalne lezije mozga, koje rastu unutar listova arahnoideje. Predstavljaju 1% svih intrakranijalnih *mass* lezija i najčešće se otkrivaju u detinjstvu i adolescenciji. U većini slučajeva, one ne izazivaju nikakve simptome. Međutim, mogu narasti do velikih dimenzija i prouzrokovati po život opasne simptome, posebno ako rastu u skučenom prostoru, kao što je zadnja lobanjska jama.

U ovom radu predstavljamo simptomatsku arahnoidalnu cistu zadnje lobanjske jame kod dvadesetdvogodišnjeg muškarca. Bolesnik je imao simptome i znakove progresivne intrakranijalne hipertenzije. CT mozga pokazala je prisustvo arahnoidalne ciste u zadnjoj lobanjskoj jami, koja pritiska okolne strukture. Cista je hirurški tretirana subokcipitalnom kraniektomijom, eksicizijom zida ciste i drenažom.

U našem istraživanju, ispitali smo istovremeno korišćenje različitih metoda drenaže arahnoidalne ciste i njihove komplikacije.

Cilj je bio pokazati da istovremena primena više alternativnih metoda hirurškog lečenja ovih cisti ima prednost u odnosu na korišćenje jedne metode lečenja, zbog manje mogućnosti recidiva.

Acta Medica Mediana 2020;59(4):43-48.

Ključne reči: arahnoidna cista, modaliteti lečenja, intrakranijalna hipertenzija