

ZNAČAJ CENTRALNIH DURALNIH SUSPENZIJA KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM TRAUMATSKIM EPIDURALNIM HEMATOMOM: PRIKAZ SLUČAJA

*Aleksandar Marković¹, Jovan Ilić¹, Ivan Stefanović^{1,2}, Vesna Nikolov^{1,2},
Miša Radisavljević^{1,2}, Jelena Kovačević¹, Nikola Stojanović¹, Marija
Đorđević²*

¹Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju, Niš, Srbija

²Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

Kontakt: Jovan Ilić
Vizantijski bulevar 112/12, 1800 Niš, Srbija
Telefon: 064/8839385
E-mail: jovanilic94@gmail.com

Traumatski epiduralni hematoma (EDH) je potrebno dijagnostikovati što pre i, ukoliko je potrebno, razmotriti njegovo operativno uklanjanje. Cilj našeg rada bio je da ukažemo na važnost postavljanja profilaktičkih centralnih duralnih suspenzija (DS) u cilju obezbeđivanja adekvatne hemostaze. Predstavljamo slučaj šezdesetdvođodišnjeg bolesnika kod koga je postavljena dijagnoza akutnog traumatskog EDH i cerebralne hemoragične kontuzije (CHK). Bolesnik je hitno operisan – tada je učinjena evakuacija EDH i CHK, uz postavljanje perifernih DS. Postoperativni tok zakomplikovao se pogoršanjem stanja svesti bolesnika do nivoa sopora i pogoršanjem levostrane hemipareze, te je načinjen kontrolni CT mozga, koji je pokazao ponovni EDH na mestu prethodne operacije. Sledstveno, bolesnik je reoperisan uz postavljanje višestrukih centralnih DS, a kontrolnim postoperativnim CT-om mozga evidentirana je potpuna evakuacija EDH. Posledično, bolesnik je na otpustu dostigao zadovoljavajući oporavak, sa rezidualnom, diskretnom levostranom spastičnom hemiparezom. Profilaktičke centralne DS važne su za postizanje adekvatne hemostaze tokom operacije pacijenata sa EDH. *Acta Medica Medianae 2023; 62(2): 83-87.*

Ključne reči: epiduralni hematoma, duralna suspenzija

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".