

## **BOLEST DEPONOVANJA IMUNOGLOBULINA G4 (IgG4) I GRANULOMATOZA SA POLIANGITISOM KOD DECE: PRIKAZ BOLESNIKA SA NOVIM SINDROMOM PREKLAPANJA**

*Milena Manojlović<sup>1</sup>, Dragana Lazarević<sup>1,2</sup>, Marija Ratković Janković<sup>1,2</sup>,  
Sandra Stanković<sup>1,2</sup>, Emilija Golubović<sup>1,2</sup>, Jelena Vojinović<sup>1,2</sup>*

<sup>1</sup>Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pedijatriju, Niš, Srbija

<sup>2</sup>Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

Kontakt: Milena Manojlović

Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija

E-mail: dr.milena.kostic@gmail.com

Telefon.: +381641530789

Granulomatoza sa poliangitisom, prethodno nazivana Wegenerova granulomatoza, jedan je od glavnih oblika vaskulitisa udruženih sa antitelima protiv citoplazme neutrofila (engl. *anti-neutrophil cytoplasm antibody* – ANCA) i najčešći vaskulitis malih i srednjih krvnih sudova kod dece. Bolest deponovanja imunoglobulina G4 (IgG4) karakteriše se inflamatornim pseudotumorima uz povišene vrednosti IgG4 u serumu. Pseudotumor orbite kod dece može biti inicijalna klinička prezentacija obaju pomenutih entiteta. U radu je prikazana devojčica sa neuobičajenom pojavom novog sindroma preklapanja ovih dvaju entiteta, koja se inicijalno prezentovala pseudotumorom orbite. Takođe, predstavljeni su izazovi dijagnostičkog postupka i primenjena terapija. *Acta Medica Medianae* 2023; 62(3):103-108.

**Ključne reči:** *granulomatoza sa poliangitisom, bolest deponovanja imunoglobulina G4 (IgG4), pseudotumor orbite*

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".