

Prikaz bolesnika

UDC: 616.349-006.6-007.43-07-08
doi: 10.5633/amm.2023.0411

SLUČAJ PROLAPSA KARCINOMA SIGMOIDNOG KOLONA KAO REDAK UZROK ISHEMIJSKE INTUSUSCEPCIJE KOD ODRASLIH

Lidija Đorđević^{1,2}, Toplica Bojić², Mirjana Marinković^{1,2}

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

²Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinu hirurgiju, Niš, Srbija

Kontakt: Lidija Đorđević
Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija
E-mail: lidijadjordjevic256@gmail.com

Intususcepcija je kod odraslih prisutna sa nespecifičnim simptomima, te može biti veoma izazovna kada je reč o postavljanju dijagnoze. Opisan je slučaj izrazito bolnog analnog prolapsa mekotkivne mase sa hematomom i znacima ishemije. Urađena je operacija i pritom je pronađena velika sigmoidna intususcepcija sa ulceroznim tumorom na 7 cm od anokutane linije. Prolbirana intususcepcija kroz anus najčešće je rektalnog porekla, mada uvek treba uzeti u obzir mogućnost prolapsa i sigmoidnog kolona. Intususcepcija debelog creva je kod odraslih često povezana sa malignitetom debelog creva, pa zahteva laparotomiju za dijagnozu i terapiju.

Acta Medica Medianae 2023; 62(4):86-91.

Ključne reči: dijagnoza, intususcepcija, sigmoidni prolaps, lečenje

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".