

BAD-KJARIJEV SINDROM KOD BOLESNIKA SA SITNOČELIJSKIM KANCEROM PLUĆA: PRIKAZ SLUČAJA

Marko Bjelaković^{1,2}, Milan Radović^{2,3}, Zoran Stamenković², Milica Bjelaković⁴, Kristina Jović²

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, student doktorskih studija, Niš, Srbija

²Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija

³Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Interna medicina i zdravstvena nega, Niš, Srbija

⁴Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju, Niš, Srbija

Kontakt: Marko Bjelaković
Bulevar dr Zorana Đindića 81, 18000 Niš, Srbija
E-mail: mbbjelakovic@gmail.com

Bad-Kjarijev sindrom (*Budd-Chiari Syndrome – BCS*) predstavlja retku bolest uzrokovana opstrukcijom hepatičnih vena koja se može javiti bilo gde na putu od hepatičnih venula do mesta gde se donja šuplja vena uliva u desnu komoru. Kongestija jetre dovodi do hipoksičnog oštećenja hepatocita. Hematološke i maligne bolesti predstavljaju etiološke faktore povezane sa Bad-Kjarijevijem sindromom. Pomenuti sindrom je retko stanje kod osoba sa kancerom pluća; poslednjih decenija opisano je samo nekoliko takvih slučajeva. U ovom radu prikazan je veoma redak slučaj akutnog Bad-Kjarijevog sindroma kod bolesnika sa primarnim sitnočelijskim kancerom pluća izazvanim tumorskim trombom donje šuplje vene. Nakon što je dijagnoza postavljena na osnovu nalaza ultrazvuka, započeto je lečenje antikoagulantnom terapijom. Specifično onkološko lečenje nije započeto zbog lošeg opštег stanja bolesnika i zbog značajnog oštećenja njegove jetre. Bolesnik je otpušten iz bolnice uz preporuku da nastavi simptomatsko lečenje. Valjalo bi da kliničari imaju na umu da akutni Bad-Kjarijev sindrom može biti obeležje kancera pluća koji nije prepoznat.

Acta Medica Mediana 2024; 63(4):122–129.

Ključne reči: *Bad-Kjarijev sindrom, kancer pluća*

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".