

Originalni rad

UDC: 618.146-006:616.89-008.454

doi: 10.5633/amm.2025.0307

POJAVA RAZLIČITIH VRSTA DEPRESIJE KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOMOM GRLIĆA MATERICE

Irena Conić^{1,2}, Slavica Stojnev^{3,4}, Suzana Tošić Golubović^{5,6}, Ivan Petković^{1,2}, Ana Cvetanović^{1,2}, Dane Krtinić^{2,7}, Milica Radić^{1,2}, Marijana Milović Kovačević^{8,9}, Aleksandar Živadinović^{10,11}, Dušan Simić^{10,12}

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Onkologija, Niš, Srbija

²Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za onkologiju, Niš, Srbija

³Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Patologija, Niš, Srbija

⁴Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za patologiju, Niš, Srbija

⁵Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Niš, Srbija

⁶Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za psihijatriju, Niš, Srbija

⁷Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmakologija sa toksikologijom, Niš, Srbija

⁸Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za onkologiju, Beograd, Srbija

⁹Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija

¹⁰Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Ginekologija sa akušerstvom, Niš, Srbija

¹¹Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Niš, Srbija

¹²Dom zdravlja Niš, Niš, Srbija

Kontakt: Irena Conić
Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija
E-mail: irena.conic@medfak.ni.ac.rs

Informacija da osoba boluje od teške bolesti koja je opasna po život, iznenadna hospitalizacija, hirurška intervencija i druge mogućnosti lečenja koje mogu ugroziti biopsihosocijalni integritet pojedinca predstavljaju stresnu situaciju koja može dovesti do akutne reakcije na stres ili poremećaja prilagođavanja.

Globalni cilj ovog istraživanja bio je da se ispita uticaj vrste terapije karcinoma grlića materice na psihički status pacijentkinja i pojavu depresije.

Osnovni princip istraživanja bila je komparativna analiza rezultata dobijenih korišćenjem instrumenata za procenu stepena depresije u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. U okviru prve eksperimentalne grupe izvršeno je poređenje pacijentkinja koje su podvrgnute operaciji i postoperativnoj hemoradijaciji. U okviru druge eksperimentalne grupe urađeno je poređenje pacijentkinja koje nisu bile operisane, ali su bile podvrgnute radikalnoj hemoradijaciji. Korišćeni su sledeći instrumenti istraživanja: polustrukturirani psihijatrijski intervju, ginekološki parametri (lokalni nalazi i stadijum bolesti) i Hamiltonova skala za depresiju.

Univarijantna logistička regresiona analiza pokazala je da je kod pacijentkinja pre operacije (OR = 24,17; 95% PI: 4,81–121,57 i p < 0,001) i kod pacijentkinja pre radikalne hemoradijacije (OR = 45,99; 95% PI: 8,70–243,15 i p < 0,001) postojao značajno veći rizik od razvoja depresije nego kod pacijentkinja iz kontrolne grupe.

Radikalna histerektomija je praćena porastom depresivnosti i u preoperativnom periodu i nakon operativnog lečenja. Radikalna hemoradijacija dovodi do povećanja depresivnosti u većem stepenu nego radikalna histerektomija i pre i posle tretmana.

Acta Medica Medianae 2025; 64(3): 53–62.

Ključne reči: karcinom grlića materice, depresivnost, terapija

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".