

Prikaz slučaja

UDC: 616.361-007.272
doi: 10.5633/amm.2025.0316**ISTRAŽIVANJE BILIJARNOG ILEUSA: REDAK I
KOMPLEKSAN KLINIČKI SLUČAJ***Ljubiša Milošević¹, Mladen Kasalović¹, Aleksandar Jakovljević¹,
Gojko Igrutinović², Nikola Miljković¹, Zlatan Elek², Saša Dimić¹*¹Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, Klinika za hirurgiju, Kosovska Mitrovica, Srbija²Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet,
Katedra za hirurgiju, Kosovska Mitrovica, SrbijaKontakt: Mladen Kasalović
Anri Dinana 10, 38220 Kosovska Mitrovica, Srbija
E-mail: mladen.kasalovic@med.pr.ac.rs

Bilijarni ileus je retka komplikacija povezana sa holecistitizom. Premda čini manje od 4% opstrukcija tankog creva kod bolesnika koji imaju manje od 65 godina, prevalencija bilijarnog ileusa raste na 25% kod bolesnika koji imaju više od 65 godina. Lekari treba da odluče da li će odmah zatvoriti jednostepenu ili dvostepenu holecistointestinalnu fistulu ili će sačekati prirodno zatvaranje.

Šezdesetdvođodišnja bolesnica je došla na Kliniku za hirurgiju sa jakim bolovima u stomaku, uglavnom sa desne strane, i sa osećajem nadutosti. Kao simptome je navela zatvor, mučninu i povraćanje. Zakazana je hitna eksplorativna laparotomija. U toku hirurškog zahvata je pažljivim istraživanjem uočeno značajno proširenje proksimalnog dela creva i pronađen je kamen u žuči koji je dospao u jejunum. Kamen je uspešno uklonjen, a potom je zatvoreno mesto enterotomije.

U ovom radu je prikazano stanje koje se retko sreće u praksi. Kod starijih bolesnika kod kojih postoje kliničke manifestacije opstrukcije creva i hronični problemi sa žučnom kesom treba razmotriti ovu retku bolest; to posebno važi za žene i starije bolesnike.

*Acta Medica Medianae 2025; 64(3): 124–129.***Ključne reči:** bilijarni ileus, sindrom Bouveretou enterotomija, kamen u žuči, povraćanje

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".