

**PONOVLJENA KONFUZNA STANJA NAKON PREKIDA  
TERAPIJE PAROKSETINOM U SLUČAJU  
PEDESETJEDNOGODIŠNJE BOLESNICE SA PSIHOTIČNOM  
DEPRESIJOM**

*Horst J. Koch*

Chefarzt der Klinik fur Psychiatrie  
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau  
Karl-Keil Str. 35, 08060 Zwickau, Germany

Kontakt: Horst J. Koch  
Klinika za psijijatriju, Chefarzt  
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau  
Karl-Keil Str. 35, 08060 Zwickau, Germany  
Email: horst.koch@hbk-zwickau.de

Pedesetjednogodišnja bolesnica koja je bolovala od depresije sa psihotičnim simptomima, uključujući i istoriju meningitisa i epilepsije iz perioda detinjstva, godinama je lečena paroksetinom, olanzapinom i lamotriginom. Svaki put kada je prekidala terapiju paroksetinom razvijala je konfuzno stanje koje je zahtevalo intenzivnu psihiatrijsku negu. Bolesnica se oporavljala nekoliko dana nakon ponovnog uvođenja terapije paroksetinom. Kliničari bi trebalo da imaju u vidu pojavu ozbiljnih reakcija nakon prekidanja selektivnih inhibitora preuzimanja serotoninina, naročito kod bolesnica sa istorijom neuroloških bolesti. *Acta Medica Medianaæ 2015; 54(3):51-53.*

***Ključne reči:*** sindrom diskontinuiteta, paroksetin, konfuzno stanje, neurološka bolest