

OBOSTRANA OSIFIKACIJA STILOHIOIDNOG LIGAMENTA

*Milorad Antić¹, Vladimir M. Antić², Braca Kundalić¹, Dane Krtinić³,
Miljana Pavlović¹, Jovana Čukuranović-Kokoris¹*

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za anatomiju, Niš, Srbija¹

Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,

Katedra medicinskih predmeta, Niš, Srbija²

Klinika za onkologiju, Klinički centar Niš, Srbija³

Kontakt: Milorad Antić

Medicinski fakultet

Bulevar Dr Zoran Đinđić 81, Niš, Srbija

E - mail: antic.miki87@gmail.com

Stilohioidni ligament se pruža od stiloidnog nastavka slepoočne kosti do malog roga hioidne kosti. U literaturi su opisani različiti oblici okoštavanja ove anatomske strukture. U našem slučaju, radi se o obostranoj osifikaciji stilohioidnog ligamenta, što se veoma retko sreće. Sa desne strane osifikacija je delimična, a sa leve potpuna. Desni stilohioidni ligament je labavom vezom pričvršćen za stiloidni nastavak, a zatim sledi veći, okoštali deo veze, da bi se u vidu vezivno-tkivnog spoja pripojio za mali rog hioidne kosti. Levo je prisutan stiloidni nastavak sa svojom osnovom i potpuno okoštali stilohioidni ligament sve do malog roga hioidne kosti. *Acta Medica Medianae* 2016;55(2):46-49.

Ključne reči: stilohioidni ligament, osifikacija