

HIV I AIDS U TRUDNOĆI

*Lidija Popović-Dragonjić^{1,2}, Miodrag Vrbic^{1,2}, Maja Jovanovic^{1,2},
Radomir Živadinović^{1,3}, Dane Krtinić³*

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija¹
Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar, Niš, Srbija²
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar, Niš, Srbija³

Kontakt: Dane Krtinić
Ul. Svetozara Markovića br. 3,
18000 Niš, Srbija
E-mail: kdane86@gmail.com

Problem HIV infekcije u trudnoći treba sagledati kroz prevenciju, otkrivanje i adekvatnu terapiju i praćenje stanja. Prevencija i otkrivanje podrazumevaju saradnju ginekoloških službi i službi preventivne medicine i savetovališta za trudnice. Praćenje statusa i porođaj HIV pozitivne trudnice vrši se po strogo određenim protokolima i zahteva saradnju ginekologa i infektologa, kao i trudnice. Pomenuti protokoli smanjuju, rizik vertikalne transmisije HIV infekcije smanjen je sa 25-30% na manje od 2%. *Acta Medica Medianaæ 2016;55(3):85-91.*

Ključne reči: *HIV infekcija, trudnoća, vertikalna transmisijska*