

LEZIJA PREDNJE UKRŠTENE VEZE KAO UZROK BLOKADE KOLENA

*Dušan Đorđević¹, Zoran Golubović^{2,3}, Snežana Đorđević Žunčić⁴, Predrag Stojiljković³,
Ivan Golubović³, Saša Mladenović¹,
Srđan Starčević⁵, Marko Kadija⁶*

Ortopedski odsek Vojna bolnica Niš, Srbija¹

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija²

Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar Niš, Srbija⁵

Dom zdravlja Niš, Srbija⁴

Klinika za ortopediju i traumatologiju VMA Beograd, Srbija⁵

Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija⁶

Kontakt : Dušan Đorđević

Ul. Bledska 4/20 Niš

E-mail: millhnis@gmail.com

Povrede kolena najčešće su kod mlađih, fizički aktivnih ljudi. Neposredno posle povrede kolena dominiraju bol, izliv i fleksiona kontrakturna u manjem ili većem obimu. Fleksiona kontrakturna ili blokada kolena nastaje umetanjem mehaničke prepreke između zglobovnih površina. Osim pravih i sa mehaničkog aspekta opravdanih blokada kolena, postoje i pseudoblokade kolena. Pseudoblokada kolena je stanje u kome postoji ograničenje završne ekstenzije kolena i izostanak završne spoljne rotacije potkoljenice, a nije uzrokovano mehaničkim faktorom, odnosno umetanjem neke od unutrašnjih struktura između zglobovnih površina. Cilj rada bio je utvrditi učestalost lezije prednje ukrštene veze kolena kod bolesnika sa blokadom kolena. Na Ortopedskom odseku Vojne bolnice u Nišu u periodu od 16.05.2009. do 21.09.2010. godine urađeno je 85 artro-skopija kolena kod bolesnika sa kliničkim znacima blokade kolena. Artrioskopski je utvrđeno da je najčešći uzrok blokade kolena u analiziranoj grupi bila lezija prednje ukrštene veze (totalna, parcijalna i u kombinaciji sa lezijom meniskusa) kod 35 (41,2%) ispitanika, dok je kod 21 (24,7%) ispitanika, uzrok blokade kolena bila lezija medijalnog meniskusa. *Acta Medica Medianae 2016; 55(4): 92-96.*

Ključne reči: blokada kolena, artroskopija, prednja ukrštena veza