

KARCINOM DOJKE KAO SEKUNDARNI TUMOR NAKON RADIOTERAPIJE KOD BOLESNICE SA HOČKINOVIM LIMFOMOM: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE

*Detanac Džemail¹, Detanac Dženana¹, Čeranić Avdo¹,
Mersudin Mulić²*

Opšta bolnica Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija¹
Državni univerzitet Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija²

Kontakt : Džemail Detanac
Sutjeska BB, 36300 Novi Pazar
E-mail dzemail.detanac@gmail.com

Karcinom indukovano prethodnom zračnom terapijom predstavlja tešku komplikaciju ovakvog lečenja.

Predstavljamo bolesnicu s karcinomom dojke, koji se razvio nakon lečenja Hočkinove bolesti, dvanaest godina nakon što je bolest detektovana. Karcinom dojke je otkriven nakon Core biopsije dojke. Bolesnica je lečena neo-adjuvantnom hemoterapijom i preoperativnom radio terapijom desne dojke. Nakon toga je učinjena radikalna mastektomija desne dojke uz disekciju desne aksile. Nakon histopatološke obrade tkiva, potvrđen je invazivni duktalni karcinom dojke. Važno je istaknuti da postoje potencijalni rizici i dugoročne komplikacije antitumorske terapije kod preživelih bolesnika lečenih od karcinoma. *Acta Medica Medianae 2017;56(1):71-74.*

Ključne reči: Hočkinov limfom, karcinom dojke, sekundarni malignitet