

EFEKTIVNO DAVANJE LEKA NABIKSIMOLSA SA PREKIDIMA KOD BOLESNIKA SA AUTIZMOM (ASPERGEROV SINDROM)

Horst J. Koch

Klinika Heinrich Braun, Odeljenje za psihijatriju i psihoterapiju, Zwickau, Nemačka

Kontakt: Horst Koch MD PhD DCPSA MFP
Heinrich Braun Klinikum Zwickau
Karl-Keil-Straße 35
08060 Zwickau, Germany
E-mail: horstjosef.koch@t-online.de

Četrdesetšestogodišnji bolesnik koji pati od Aspergerovog sindroma pokušao je da popravi svoje stanje kod autizma, uključujući i društvenu izolovanost, uzimanjem doza nabiksimolsa u razmacima, u trajanju od pet godina. Bolesnik je potvrdio korišćenje droge osamnaest godina pre toga i bio je negativan na svim ponovljenim testovima koji su rađeni u ambulantnim uslovima. Bio je u stanju da komunicira sa ljudima, da završi kurs iz informatike i da počne da radi kao samostalni IT stručnjak. Po prestanku uzimanja nabiksimolsa, njegovo kliničko stanje se ponovo pogoršalo, uključujući i socijalni aspekt. Premda ovaj slučaj pokazuje značajno poboljšanje stanja kod autizma uzimanjem nabiksimolsa sa pauzama, potrebna su dalja istraživanje za potvrdu ovog principa. Acta Medica Medianae 2017;56(2):102-104.

Ključne reči: : Aspergerov sindrom, nabiksimols, receptori za kanabis, reintegracija