

**Prikaz slučaja**

**UDK: 616.831-005.1:616.37-002.1**

**doi:10.5633/amm.2017.0312**

## **EPIDURALNI HEMATOM KOD BOLESNICE SA AKUTNIM PANKREATITISOM: PRIKAZ SLUČAJA**

*Nenad Savić<sup>1</sup>, Biljana Stošić<sup>1,2</sup>, Danica Marković<sup>1</sup>, Vesna Dinić<sup>1</sup>*

Centar za anestezijologiju i reanimaciju, Klinički centar Niš, Srbija<sup>1</sup>  
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija<sup>2</sup>

Kontakt: Nenad Savić  
Radoja Dakića 53-2/18, 18000 Niš, Srbija  
nndsavic@yahoo.com

Ženska osoba starosti 59 godina primljena je u regionalnu bolnicu sa dijagnozom akutnog pankreatitisa. Posle šest dana, postavljen joj je epiduralni kateter sa ciljem kupiranja bolova u abdomenu. Dvanaest sati kasnije, bolesnica je dobila paraplegiju. Odmah su urađene laboratorijske analize i uočen je INR od 4,69. Otkriveno je da je bolesnica dobila 40 mg enoksaparina potkožno pet sati pre epiduralne punkcije. Odmah je upućena u univerzitetsku kliniku gde je urađeno MRI snimanje i viđen epiduralni hematom. Preminula je 45 dana nakon prvog prijema u bolnicu. Pošto je nastanak koagulopatije moguć sa napredovanjem bolesti, koagulacioni status se mora proveriti pre postavljanja epiduralnog katetera kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom. *Acta Medica Medianae* 2017;56(3):77-80.

***Ključne reči:*** akutni pankreatitis, epiduralni hematom, koagulopatija