

Prikaz bolesnika

UDK: 616-006.44-091.8
doi:10.5633/amm.2017.0309

HISTOPATOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE RAPIDNO PROGRESIVNOG ALK NEGATIVNOG ANAPLASTIČNOG KRUPNOĆELIJSKOG T-LIMFOMA KOŽE

*Jovan Nikolić¹, Aleksandar Milićević¹, Jadranka Paravina²,
Ivan Petković³, Milica Mihailović⁵, Miloš Stanković⁴, Žaklina
Mijović^{1,5}, Dragan Mihailović^{1,5}*

Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija¹
Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija²
Klinika za onkologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija³
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija⁴
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija⁵

Kontakt: Jovan Nikolić
Svetozara Markovića 32A/2
18000 Niš, R. Srbija
e-mail: jovannikolic88@gmail.com

Anaplastični krupnoćelijski limfom (ALCL) je redak tip nehoćinskog limfoma T-ćelijskog porekla. Dijagnoza ALCL-a zahteva biopsiju tumora sa histopatološkom verifikacijom. Morfološke karakteristike zahtevaju imunofenotipizaciju T ćelija sa pozitivnom ekspresijom CD3 ili CD4 markera, a uvek je obavezujuća ekspresija CD30 u svim neoplastičnim ćelijama. Prikazan je četrdesetšestogodišnji muškarac sa uznapredovalom kliničkom formom ALK negativnog kutanog ALCL. S obzirom na značajne razlike u prognozi između ALK negativnih sistemskih ALCL i kožnih oblika ALCL, bliska saradnja onkologa, hematologa, patologa i dermatologa predstavlja najbolju garanciju u postavljanju adekvatne dijagnoze bolesti i primene odgovarajućeg tretmana kod ovih bolesnika. *Acta Medica Medianae 2017;56(3):55-61.*

Ključne reči: limfom, krupnoćelijski, anaplastični, ALK protein, humani