

PSEUDOCISTE PANKREASA: OPTIMALNO VREME HIRURŠKOG LEČENJA

Saša Dimić¹, Milan Radojković^{2,3}, Ivana Dimić⁴, Dušan Petrović¹,
Aleksandar Karanikolić^{2,3}

¹Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica, Hirurško odeljenje, Kosovska Mitrovica, Srbija

²Klinika za Hirurgiju, Klinički Centar Niš, Niš, Srbija

³Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

⁴Dom zdravlja, Kosovska Mitrovica, Srbija

Kontakt: Milan Radojković
Ul.Sestara Baković 14/28, 18000 Niš
E-mail: mida71@mts.rs

Pseudociste pankreasa nastaju kao komplikacija akutnog ili hroničnog pankreatitisa. Uprkos stalnom razvoju minimalno invazivnih procedura, hirurško lečenje je i dalje najvažnija terapijska opcija za ove bolesnike. Optimalno vreme za operaciju pseudociste zavisi od uzroka ciste, njenog evolutivnog stadijuma i prisustva komplikacija. Cilj našeg rada bio je da utvrdimo značaj vremena hirurškog lečenja u odnosu na tip i stadijum pseudociste za uspeh lečenja. Sprovedeli smo retrospektivnu analizu medicinske dokumentacije 68 bolesnika operisanih zbog pseudociste pankreasa na Klinici za hirurgiju Kliničkog centra u Nišu. Od 50 elektivno operisanih, kod šestoro je urađena eksterna drenažna procedura zbog nezrelog, tankog zida ciste. Takođe, eksterna drenažna pseudociste je sprovedena kod 15 urgentno operisanih bolesnika sa komplikovanim pseudocistama. Kod ostalih bolesnika iz obe grupe primenjena je unutrašnja drenažna procedura. Nije bilo smrtnih ishoda. Kontrolisana postoperativna pankreasna fistula javila se kod dva bolesnika nakon elektivne unutrašnje drenažne operacije i kod sedam bolesnika sa komplikovanom pseudocistom kod kojih je sprovedena urgentna spoljašnja drenaža. Akutne i hronične pseudociste starije od 6 do 8 nedelja sa formiranim zrelom kapsulom, koje ne pokazuju tendenciju spontane regresije, zahtevaju hiruršku ili endoskopsku drenažu. Unutrašnja hirurška drenažna procedura se ne treba primenjivati kod nezrelih i komplikovanih pseudocista sa tankim zidom, već ovakve lezije treba rešavati spoljašnjom drenažom. Optimalno vreme operacije pseudociste pankreasa može biti ključno za krajnji ishod lečenja.

Acta Medica Mediana 2017;56(4):61-65.

Ključne reči: pankreas, pseudociste, hirurško lečenje