

PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOLESNIKA SA PSORIJAZOM: NAŠA ISKUSTVA

Gordana Nikolić^{1,2}, Milenko Stanojević³, Olivera Žikić^{1,2},
Suzana Tošić-Golubović^{1,2}

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za psihijatriju, Niš, Srbija

²Klinika za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

³Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za dermatologiju i venerologiju, Niš, Srbija

Kontakt: Gordana Nikolić
Bulevar dr Zorana Đindjića 81, 18 000 Niš, Srbija
E mail: gordanani@gmail.com

U konsultativnoj psihijatrijskoj praksi primetili smo negativne emocionalne reakcije i poremećaje raspoloženja kod bolesnika sa psorijazom. U našem radu smo želeli da utvrdimo prisustvo psiholoških simptoma i psihijatrijskih poremećaja među bolesnicima sa psorijazom i odnos između psiholoških crta i težine psorijaze.

Pregledali smo 30 ambulantnih bolesnika sa psorijazom po metodi uzastopnih odabira. Težinu psorijaze smo odredili putem PASI skora. Za psihološko ispitivanje smo upotrebili: nestrukturisani klinički intervju, M.I.N.I. upitnik za postavljanje psihijatrijske dijagnoze, KON- 6 inventar za određivanje crta ličnosti. Pirsonovom linearnom korelacijom smo odredili odnos između t-vrednosti psiholoških dimenzija sa vrednostima PASI skora.

Četvrtina uzorka je imala blagu depresiju, anksiozni i panični poremećaj. Bolesnici sa blagom formom psorijaze su imali manji neuroticizam, oni sa ekstroverzijom su imali manje izraženu somatizaciju.

Naši bolesnici su zbog niskog samopoštovanja osećali napetost, nelagodnost, stidljivost. Mali psihijatrijski komorbiditet je verovatno zbog malog uzorka ispitanika.

Blaga psorijaza je povezana sa manjim neuroticizmom i potrebno je dalje praćenje ispitanika da bi se ispitao psihološki i medicinski ishod u odnosu na težinu psorijaze.

Acta Medica Mediana 2018;57(2):12-17.

Ključne reči: psorijaza, psihološke karakteristike