

NAZOFARINGEALNI PLAZMABLASTNI LIMFOM: PRIKAZ BOLESNIKA

*Aleksandar Milićević¹, Jovan Nikolić¹, Dragan Mihailović¹, Jovan Janić²,
Milica Mihailović²*

¹Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

²Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija

Kontakt: Aleksandar Milićević
Vojvode Mišića 5, Niš, Srbija
E-mail: ackom88@gmail.com

Plazmablastni limfom (PBL) je redak agresivni podtip nehočkinovog limfoma (NHL). Javlja se najčešće u usnoj duplji starijih bolesnika i HIV pozitivnih osoba. Prikazan je slučaj plazmablastnog limfoma u nazofarinksu starijeg muškarca. Zbog specifičnog imunofenotipa i retke incidencije ovog tumora česte su greške u postavljanju dijagnoze od strane patologa. Najveći izazov u diferencijalnoj dijagnozi plazmablastnog limfoma jeste njegovo razlikovanje od plazmoblastnog (anaplastičnog) plazmoćelijskog mijeloma, zbog morfoloških i imunofenotipskih osobina koje se preklapaju.

Acta Medica Medianae 2018;57(2):81-84.

Ključne reči: plazmablastni limfom, nazofarinks, imunohistohemija